2. Куперман Ф.М. Морфологическая физиология растений / Ф.М. Куперман. – М. : Изд-во "Высш. шк.", 1973. – 256 с.

3. Гриненко Н. Дослідження органогенезу генеративних бруньок персика в Лісостепу України / Н. Гриненко, І. Кудренко // Вісник Київського національного університету. – Сер.: Інтро-дукція та збереження рослинного різноманіття. – 2007. – Вип. 12-14. – С. 65-67.

4. Тарасюк О.І. Структурні особливості закладання генеративних органів у видів роду *Ropulus* L. / О.І. Тарасюк // Актуальні проблеми ботаніки та екології : матер. Міжнар. конф. молодих учених. – Сімферополь : Вид. дім "АРИАЛ", 2010. – С. 419-420.

5. Термена Б.К. Критические периоды в годичном цикле развития древесных интродуцентов умеренных широт / Б.К. Термена // Теория и методы интродукции растений и зеленого строительства : сб. науч. тр. – К. : Изд-во "Наук. думка", 1980. – С. 95-97.

6. Термена Б.К. О выявлении адаптационных возможностей древесных интродуцентов (в связи с климатическими условиями) / Б.К. Термена // Бюллетень Главного ботанического сада АН СССР. – М. : Изд-во "Наука". – 1982. – Вып. 125. – С. 10-16.

7. Термена Б.К. Особенности органогенеза генеративных побегов древесных интродуцентов в Прикарпатье / Б.К. Термена, А.В. Бацура, М.И. Выкляк, О.И. Горук // Бюллетень Главного ботанического сада АН СССР. – М. : Изд-во "Наука". – 1984. – Вып. 131. – С. 11-18.

8. Шевченко С. Особенности репродуктивной биологии некоторых редких растений юга Украины / С. Шевченко, А. Тер-Погосян // Вісник Київського національного університету. – Сер.: Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 2007. – Вип. 12-14. – С. 91-98.

Надійшла до редакції 21.03.2016 р.

Литвиненко С.Г. Особенности органогенеза генеративных побегов в почках возобновления североамериканских древесных интродуцентов на Буковине

Изложены результаты исследований III-V этапов органогенеза в почках 30 видов североамериканских древесных интродуцентов, культивируемых в дендрарии ботанического сада Черновицкого национального университета. У 7 из исследуемых видов переход конуса нарастания к формированию генеративной сферы (III этап) и формирование органов зачаточного цветка (V этап) происходит весной в год цветения. У 10 видов III этап органогенеза начинается в первой половине лета, в период завязывания и развития плодов, у 13 видов – во второй половине лета в год, предшествующий цветению. Обнаружена взаимосвязь между сроками отдельных этапов органогенеза и фенологическими фазами развития растений, что позволяет установить индикаторные для каждого вида фенологические фазы.

Ключевые слова: органогенез, репродуктивные структуры, североамериканские древесные интродуценты, Буковина.

Litvinenko S.G. Some Peculiarities of Formation of Reproductive Organs in Buds of Northern American Woody Introducents in the Conditions of Bukovina

The results of investigation of III-V stages of reproductive organs' formation in flower and mixed buds of 30 species of northern-American woody introducents cultivated in Chernivtsy National University Botanical Garden are presented. The transition of growing point to formation of generative organs (III organogenesis stage) and formation of flower organs (V organogenesis stage) in buds of 7 species is estimated to take place in spring in the year of flowering. In buds of 10 species III organogenesis stage begins in first half-summer period at the same time with the setting and development of fruit. The transition of growing point to formation of generative organs in buds of 13 species begins in the second half-summer period in the year before flowering. It was found that connection between organogenesis and phenological stages displayed and it's allowed to determine phenological indicators to investigated species.

Keywords: formation of reproductive organs, Northern-American woody introducents, Bukovina.

УДК 581.52

СТАН ЦЕНОПОПУЛЯЦІЙ *PLATANThERA BIFOLIA* (L.) RICH. НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ

І.П. Любинець¹, І.Г. Хомин², Н.М. Ференц³, Г.А. Лисак⁴

Викладено результати досліджень екологічних особливостей *Platanthera bifolia* на території Українського Розточчя. На цей час ценопопуляції перебувають у досить безпечному стані: вони є молодими, нормальними, повночленними. Значна частка особин ювенільного стану у віковому спектрі свідчить про добре насіннєве поновлення. У ценопопуляціях присутні особини трьох основних класів віталітету, що зменшує їх уразливість до несприятливих факторів, якими є потужні деградаційні процеси в рослинному покриві (внаслідок припинення сільськогосподарської діяльності), а також антропогенний фактор, а саме весняні підпали, сліди яких спостерігались на одній із пробних площ.

Ключові слова: ценопопуляція, лобка дволиста, щільність, вікова та віталітетна структура.

На сьогодні у світі існує проблема збереження видового різноманіття рослинного покриву. Під впливом антропогенних змін багато видів, зокрема і представники родини *Orchidaceae*, випадають із складу флори. Для правильного оцінювання стану та формування дієвих заходів охорони кожного виду потрібні дані про поширення, особливості біології, структури і динаміки популяцій у конкретному регіоні.

Українське Розточчя – цікавий фізико-географічний регіон Західної України, який поєднав риси Карпат, Полісся та Поділля. Флору Розточчя вивчали упродовж 200 років такі відомі ботаніки як Ж. Круль (1878), Є. Волошак (1874), С. Стойко (1990), О. Кагало (1990), М. Сорока (1999), М. Загульський (2000) та ін. Узагальнені дані про видовий склад і поширення Зозулинцевих Українського Розточчя знаходимо в працях М. Загульського (38 видів орхідних) [5], М. Сороки (31 вид) [21]. Знайти літературу, в якій безпосередньо досліджено особливості популяцій *Platanthera bifolia* (L.) Rich. на території цього регіону, нам не вдалось, за винятком окремих публікацій, де епізодично згадується про стан ценопопуляцій (надалі ЦП) цього виду [11-13]. Тому, з метою вивчення специфіки ценопопуляцій любки дволистої у різних біотопах, а саме в південній і центральній частинах Українського Розточчя, було закладено дві пробні площі.

Визначено чисельність і щільність ЦП *P. bifolia* у досліджених локалітетах. За щільність приймали відношення кількості особин до одиниці площі [15]. Обрахунковими одиницями слугували морфологічні особини, оскільки лобка дволиста – вид з моноцентричною біоморфою [19, 23]. Використано класифікацію вікових станів, яку розробив Т.О. Работнов [17, 18], доповнив О.О. Уранов [24], а також М.Г. Вахрамєєва і Л.В. Денисова [1, 2] стосовно видів *Orchidaceae*. Для визначення вікових станів використано літературні дані [2, 6]. Виділено чотири вікові групи: ювенільні (j), іматурні (im), дорослі вегетативні (vv) та генеративні (g). Проростки, що ведуть підземний спосіб життя, не враховували з ме-

¹ нач. відділу науки та екологічної освіти І.П. Любинець – Яворівський національний природний парк;

² наук. співроб. І.Г. Хомин – Природний заповідник "Розточчя";

³ наук. співроб. Н.М. Ференц – Природний заповідник "Розточчя";

⁴ доц. Г.А. Лисак, канд. біол. наук – Львівський національний аграрний університет

тою уникнення значного втручання у фітоценози. Виявити сенильні особини важко у зв'язку з тим, що частина особин відмирає одразу після генеративної стадії [1], тому їх теж не брали до уваги.

Для Зозулинцевих характерна перерва у цвітінні, тобто перехід генеративних особин до стану за зовнішніми ознаками подібного до віргінільних. Тому віковий стан називають у них не віргінільним, а дорослим вегетативним (vv). Особини цього вікового стану включають рослини віргінільні та генеративні, які тимчасово не мають генеративного пагона [23]. Тип вікових спектрів визначено за класифікацією Л.В. Денисової, С.В. Нікітіної, Л.Б. Заугольової [16], а тип популяції – за класифікацією Т.О. Работнова [17] і за класифікацією "дельта-омега" Л.А. Животовського [4]. З метою інтегральної оцінки онтогенетичної структури ценопопуляцій *Platanthera bifolia* для них визначено індекс віковості (Δ) за методикою О.О. Уранова [24], індекс ефективності (ω) за Л.А. Животовським [4].

Внутрішньопопуляційну мінливість вивчали шляхом морфометричних досліджень репрезентативної вибірки ценопопуляцій у 25 генеративних особин за такими ознаками: 1) висота рослини; 2) висота суцвіття; 3) довжина листків; 4) ширина листків; 5) кількість квітів; 6) кількість плодів. Отримані цифрові дані оброблено варіаційно-статистичними методами [7, 10].

Вивчення віталітетної структури популяції проведено за методикою Ю.А. Злобіна [8, 9], враховуючи рекомендації щодо виконання популяційних досліджень рідкісних видів [3]. Останній етап віталітетного аналізу виконано за допомогою спеціальної комп'ютерної програми VITAL з визначенням рівня статистичної вірогідності оцінок віталітету ценопопуляції. Одна з виявлених популяцій *Platanthera bifolia* розташована у північно-західній околиці с. Поріччя у південній частині Розточчя на межі цього регіону із Придністровською рівниною та Надсянням.

Популяція цього виду росте на сухій ділянці з лучною рослинністю і займає територію, що простягається смугою завширшки до 20 м і завдовжки близько 300 м на північній слабопохилій, проте добре освітленій експозиції яру. Землі по обидва боки цього яру десятиліттями використовували під сільськогосподарські угіддя: з північної сторони – городні наділи селян, з південної – поля. Сама яружна система слугувала для випасу великої рогатої худоби та сінокосіння, що очевидно, сприяло процвітання існуючої популяції любки дволистої. Проте за останні два десятиліття внаслідок занепаду сільськогосподарського виробництва, практично зведення нанівець поголів'я домашньої худоби, а, значить, припинення сінокосіння і випасання, відбуваються потужні деградаційні процеси в рослинному покриві, зокрема і в цій місцевості.

Оскільки в попередній період тут не проводили моніторингові дослідження, можемо лише візуально зазначити, що загальний стан популяції любки дволистої внаслідок заростання травами і чагарниками істотно погіршився. Лише в 2014 р. на терасі, яка розташована в середній частині схилу яру, було закладено трансекту завдовжки 10 м і шириною 1 м для вивчення стану *Platanthera bifolia* (ПП № 2). На цій ділянці деревно-чагарникова рослинність представлена поодинокими особинами *Pyrus communis* L., *Crataegus* sp., *Rosa* sp. Загальне

проективне покриття трав'яного покриву становить 98 % і представлене такими видами: *Poa* sp. – 80 %, *Achillea submillefolium* (Klok. et Krytzka) – 25 %, *Galium verum* L. – 6 %, *Potentilla erecta* (L.) Raeuch. – 5 %, *Agrimonia eupatoria* L. – 4 %, *Stenactis annus* Nees – 3 %, *Vicia* sp. – 3 %, *Platanthera bifolia* (L.) Rich. – 2 %, *Veronica chamaedrys* L. – 2 %, *Solidago canadensis* L. – 1 %, *Juncus* sp. – 1 %, *Galium album* Mill. – 1 %, *Equisetum arvense* L. +, *Hypericum maculatum* Crantz +, *Thymus pulegioides* L. +, *Stellaria graminea* L. +, *Carex* sp. +, *Ranunculus acris* L. +, *Bellis perennis* L. +. Моховий ярус майже відсутній і становить близько 1 % від загальної площі ділянки.

Інша ценопопуляція любки дволистої локалізується у центральній частині Українського Розточчя поблизу с. Дубровиця на межі з територією Яворівського національного природного парку. Тут також було закладено пробну ділянку (ПП № 1) площею 10 м² для вивчення особливостей ЦП *Platanthera bifolia*. На цій території відбуваються аналогічні деградаційні зміни в рослинному покриві, як і на описаній вище ділянці. Окрім цього, лучний фітоценоз межує з узліссям і відбувається поступове заростання сосною звичайною. Загальне трав'яне вкриття становить 87 %, зокрема: *Platanthera bifolia* – 2 %, *Agrostis tenuis* Sibth – 10 %, *Stenactis annua* – 2 %, *Plantago lanceolata* L. – 20 %, *Daucus carota* – 1 %, *Sonchus arvensis* – 1 %, *Vicia cracca* – 1 %, *Lotus corniculatus* – 40 %, *Prunella vulgaris* – 1 %, *Achillea millefolium* – 5 %, *Equisetum arvense* – 1 %.

Відстань між ценопопуляціями по прямій лінії становить 17 км (рис. 1). На закладених трансектах особини *Platanthera bifolia* розміщені нерівномірно. Щільність на ПП № 1 змінюється в межах 4-41 ос./м² (2014 р.) та 3-23 ос./м² (2015 р.), а на ПП № 2-0-72 ос./м² (2014 р.) та 1-92 ос./м² (2015 р.).

Рис. 1. Картохема розміщення ценопопуляцій *Platanthera bifolia* (L.) Rich. на території Українського Розточчя

Для цього виду характерне групове розміщення особин – у скупченнях забезпечуються оптимальні умови для проростання насіння у зв'язку з характером розміщення мікоризи грибів. У любки інтенсивність мікоризної інфекції ювенільних та іматурних особин становить 98 %, а у дорослих вегетативних і генеративних зменшується до 28-80 % [14]. Упродовж 2014-2015 рр. середня щільність особин на ПП № 1 практично не змінилась, а на ПП № 2 – зменшилась в 1,5 раза (табл. 1). Причиною зменшення щільності можуть бути пожежі, сліди яких виявлено на ПП № 2.

Табл. 1. Демографічні характеристики досліджених ценопопуляцій *Platanthera bifolia* (L.) Rich. на території Українського Розточчя

Пробна площа	Площа, м ²	Чисельність вікових груп, ос.				Щільність, ос./м ²	Віковість, Δ	Індекс ефективності, ω	Індекс відновлення, Ів
		j	im	vv	g				
ПП №1/2014	10	20	54	50	5	12,9	0,079	0,38	2480
ПП №1/2015	10	28	56	36	10	13,0	0,0781	0,41	1200
ПП №2/2014	10	61	112	57	38	26,8	0,088	0,44	605,26
ПП №2/2015	10	23	89	40	26	17,8	0,092	0,39	584,62

Онтогенетична структура ценопопуляцій *Platanthera bifolia* (див. табл. 1) утворена чотирма основними віковими групами. Максимум вікових спектрів ЦП на обох пробних ділянках припадає на особини іматурного стану, їх відсоткова частка впродовж років вивчення збільшується: на ПП № 1 – від 41,9 до 43,1 %, а на ПП № 2 – від 41,8 % до 50,0 % (рис. 2). Вагомий внесок в онтогенетичні спектри обох ценопопуляцій роблять особини ювенільного стану, що може свідчити про добре насіннєве поновлення. Варто звернути увагу на відносно низький відсоток у віковому спектрі особин генеративного стану, особливо на ПП № 1 у 2014 р. Як наслідок, значна кількість особин прегенеративної фракції і невисока генеративної вплинули на значення віковості та індексу відновлення (Ів). На ПП № 1 Ів у 4 рази вищий, ніж на ПП № 2, оскільки відсоток генеративних особин у 3,5 раза менший. А в 2015 р. спостерігаємо зменшення значення Ів у 2 рази на ПП № 1, порівняно з аналогічним показником 2014 р., оскільки за практично незмінної загальної чисельності відбувся перерозподіл впливу чисельності онтогенетичних груп: відношення прегенеративної фракції до генеративної в 2014 р. становить 96,12: 3,88, а в 2015 р. – 92,31: 7,69.

Рис. 2. Онтогенетичні спектри ценопопуляцій *Platanthera bifolia* (L.) Rich. на території Українського Розточчя

Інтегральна оцінка онтогенетичної структури за допомогою індексів віковості та ефективності дала змогу віднести досліджувані популяції до типу "молодик" ($\Delta < 0,35$; $\omega < 0,6$). Внаслідок морфологічної пластичності значення морфопараметрів генеративних особин любки дволистої дещо відмінні у різних місцях росту. У табл. 2 подано основні статистичні показники восьми морфологічних ознак особин дослідженого виду на ПП № 1 і ПП № 2.

Проаналізувавши дані табл. 2 та морфограми (рис. 3), встановлено, що особини *Platanthera bifolia* на ПП № 1 характеризуються дещо вищими значеннями параметрів вегетативної сфери, а на ПП № 2 – генеративної.

Табл. 2. Морфометричні параметри *Platanthera bifolia* (L.) Rich. на території Українського Розточчя

Пробна площа	Стат. показник	Висота рослини	Висота суцвіття	Довжина 1 листка	Ширина 1 листка	Довжина 2 листка	Ширина 2 листка	Кількість квітів	Кількість плодів
№1	M^{+m}	46,0 ^{±1,2}	11,0 ^{±0,5}	12,7 ^{±0,6}	3,1 ^{±0,2}	12,5 ^{±0,5}	3,1 ^{±0,1}	17,0 ^{±0,8}	16,1 ^{±0,8}
	Lim	34,5-59	7,8-16,4	9,7-21,0	1,9-5,0	7,8-20,0	2,0-5,1	10-28	7-27
	Cv	12,9	21,2	22,6	28,3	21,2	22,9	24,3	25,1
№2	M^{+m}	38,6 ^{±2,0}	11,2 ^{±0,6}	7,7 ^{±0,3}	3,1 ^{±0,1}	7,7 ^{±0,3}	2,9 ^{±0,1}	19,0 ^{±1,3}	17,9 ^{±1,2}
	Lim	24,2-57,7	6,5-19,0	5,3-10,6	2,4-4,5	4,7-10,3	2,0-4,2	9-34	9-32
	Cv	26,4	27,7	21,9	18,4	22,1	22,6	33,1	33,5

Рис. 3. Морфограми *Platanthera bifolia* (L.) Rich. на території Українського Розточчя

Рис. 4. Коефіцієнти варіації морфопараметрів особин *Platanthera bifolia* (L.) Rich. на території Українського Розточчя

Коефіцієнти варіації (рис. 4) морфологічних параметрів змінюються в межах 12,9-25,1 % (ПП № 1) та 18,4-33,5 % (ПП № 2). Отже, особинам на ПП 1 притаманний середній потенціал внутрішньовидової мінливості, а для особин на ПП № 2 відзначено середній рівень варіабельності для ознак "ширина" і "довжина" листків та високий – для ознак "висота рослини", "висота суцвіття", "кількість квітів", "кількість плодів". Значно вищий показник морфологічної цілісності (85,71 %) відзначено для особини любки дволистої на ПП № 2, ніж на ПП № 1 (39,27 %).

В обох ценопопуляціях присутні особини трьох основних класів віталітету (табл. 3). Така диференціація особин за рівнями життєвості зменшує уразливість популяцій до несприятливих факторів.

Табл. 3. Віталітетна структура ценопопуляцій *Platanthera bifolia* (L.) Rich. на території Українського Розточчя

Пробна площа	Індекс якості	Статистична достовірність, %	Частка особин за класами віталітету			Віталітетний тип
			a	b	c	
ПП № 1/2014	0,26	80	0,36	0,16	0,48	Рівноважна
ПП № 1/2015	0,32	97	0,28	0,36	0,36	Рівноважна
ПП № 2/2014	0,34	50	0,24	0,44	0,32	Провітаюча
ПП № 2/2015	0,32	97	0,16	0,48	0,36	Рівноважна

Варто зазначити, що вивчені ЦП відрізняються за частками особин віталітетних класів. За роки дослідження найбільше особин *a*-класу спостережено на ПП № 1 у 2014 р., а найменше – на ПП № 2 у 2015 р. Більш стабільною є частка особин найнижчого класу віталітету (змінюється в межах 0,32-0,48, а найбільш варіабельною є частка *b*-особин (0,16-0,48), причому на ПП № 1 вона зростає в 2,6 раза, що спричинило збільшення індексу якості, незважаючи на зменшення частки особин *a*-класу в 1,3 раза. ЦП на ПП № 1 залишається рівноважною: збільшення індексу якості і відсотка статистичної достовірності свідчить про підвищення рівня життєздатності (рис. 5).

На ПП № 2 частка особин *b* і *c*-класів більш-менш стабільна, а *a*-класу зменшилась в півтора раза, що привело до зменшення індексу якості і переходу віталітетного типу популяції з провітаючої до рівноважної. Однією з причин цих змін може слугувати антропогенний фактор, а саме весняні підпали, сліди яких спостерігались на цій пробній площі (було зафіксовано пошкоджені вогнем листки *P. bifolia*).

Рис. 5. Віталітетні спектри ценопопуляцій *Platanthera bifolia* (L.) Rich. на території Українського Розточчя

Важливо зазначити, що особини високої життєдіяльності забезпечують відтворення популяцій і найбільшою мірою трансформують навколишнє середовище; особини пониженого віталітету складають резерв, який здатний швидко заповнювати незайняті місцезростання, що з'являються внаслідок порушень фітоценозів і їх сукцесійних змін; ослаблі особини найнижчої життєздатності збагачені мутаціями і тому найбільш перспективні для мікроеволюції.

Отже, вивчені ценопопуляції *Platanthera bifolia* (L.) Rich. є молодими, нормальними, повночленними. Наявність значної кількості особин ювенільного стану свідчить про задовільне насіннєве поновлення. На цей час помітного негативного впливу на ценопопуляції *Platanthera bifolia* не виявлено, проте потрібно рекомендувати регульоване викошування ділянок, щоб інтенсивне задерніння травостою не привело до елімінації виду, а також проводити роз'яснювальну роботу щодо недопущення зриву на букети та самовільних підпалів.

Література

- Вахрамеева М.Г. Некоторые особенности биологии и динамика численности ценопопуляций *Platanthera bifolia* Rich., *P. chlorantha* Reich. / М.Г. Вахрамеева, Л.В. Денисова // Охрана и культивирование орхидей. – К. : Изд-во "Наук. думка", 1983. – С. 35-38.
- Вахрамеева М.Г. Некоторые особенности биологии и динамика численности ценопопуляций двух видов рода *Platanthera* / М.Г. Вахрамеева, Л.В. Денисова // Московское о-во испытателей природы. – Отд. биологии. – 1988. – № 3. – С. 87-92.
- Голубев В.Н. Методические указания к популяционно-количественному и эколого-биологическому изучению редких, исчезающих и эндемичных растений Крыма / В.Н. Голубев, Е.Ф. Молчанов. – Ялта : Изд-во ГНБС, 1978. – 42 с.
- Животовский Л.А. Онтогенетическое состояние, эффективная плотность и классификация популяций / Л.А. Животовский // Экология : сб. науч. тр. – 2001. – № 1. – С. 3-7.
- Загальський М. Поширення та соціологічна оцінка орхідних (*Orchidaceae* Juss.) Українського Розточчя / М. Загальський // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. – Т. VII. – Екологічний зб. – Львів, 2001. – С. 227-236.
- Загальський М.М. Хорологія, структура популяцій та охорона орхідних (*Orchidaceae* Juss.) західних регіонів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук / М.М. Загальський. – Львів, 1994. – 36 с.
- Зайцев Г.Н. Методика биометрических расчетов / Г.Н. Зайцев // Математическая статистика в экспериментальной ботанике : сб. науч. тр. – М. : Изд-во "Наука", 1973. – С. 34-45.
- Принципы и методы изучения ценопопуляций растений / Ю.А. Злобин. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1989. – 146 с.
- Злобин Ю.А. Ценопопуляционный анализ в фитоценологии / Ю.А. Злобин. – Владивосток : Изд-во ДВНЦ АН СССР, 1984. – 58 с.
- Лакін Г.Ф. Биометрия / Г.Ф. Лакін. – М. : Изд-во "Высш. шк.", 1990. – 349 с.
- Лисак Г.А. Еколого-фітоценологічний аналіз місцезростань видів роду *Platanthera* у Яворівському НПП / Г.А. Лисак, І.П. Любинець // Природно-заповідний фонд Львівщини: стан та перспективи розвитку : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 15-річчю створення Яворівського нац. пр-р. парку, смт. Івано-Франкове, 2013. – С. 167-171.
- Любинець І.П. Орхидеї Яворівського НПП / І.П. Любинець // Охрана и культивирование орхидей : матер. Междунар. научн. конф. // Вестник Тверского университета. – 2007. – № 7 (35). – С. 226-230.
- Любинець І.П. Структура ценопопуляцій деяких рідкісних видів рослин лісових ценозів Яворівського НПП / І.П. Любинець // Вісті БЗ "Асканія-Нова". – 2006. – Т. 8. – С. 76-85.
- Мамаев С.А. Орхидеї Урала: систематика, біологія, охорона / С.А. Мамаев, М.С. Князев, П.В. Куликов, Е.Г. Филиппов. – Екатеринбург : Изд-во УрО РАН, 2004. – 124 с.
- Одум Е. Экология / Е. Одум. – М. : Изд-во "Мир", 1975. – 740 с.
- Программа и методика наблюдений за ценопопуляциями видов растений Красной книги СССР. – М. : Изд-во "Наука", 1985. – 34 с.

17. Работнов Т.А. Вопросы изучения состава популяций для целей фитоценологии / Т.А. Работнов // Проблемы ботаники : сб. науч. тр. – 1950 б. – Т. 1. – С. 465-483.
18. Работнов Т.А. Жизненный цикл многолетних травянистых растений в луговых ценозах / Т.А. Работнов // Труды Ботанического ин-та АН СССР. – Сер.: 3. Геоботаника. – 1950 а. – Вып. 6. – С. 7-204.
19. Смирнова О.В. Объем счетной единицы при изучении ценопопуляций растений различных биоморф / О.В. Смирнова // Ценопопуляции растений (основные понятия и структура) : сб. науч. тр. – М. : Изд-во "Наука", 1976. – С. 72-80.
20. Сорока М.І. Флора та рослинність території, зарезервованої під створення міжнародного біосферного резервату "Розточчя" (Матер. до проекту та номінальної форми) / М.І. Сорока. – Львів : Вид-во НЛТУ України, 2006. – 115 с.
21. Сорока М. Созологічна оцінка раритетних видів рослин української частини біосферного заповідника "Розточчя" / М. Сорока, А. Вольняк // Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Сер.: Біологічна. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка. – 2013. – Вип. 63. – С. 75-85.
22. Сорока М.І. Флора судинних рослин Українського Розточчя / М.І. Сорока. – Львів : Вид-во НЛТУ України, 2002. – 154 с.
23. Татаренко И.В. Орхидные России: жизненные формы, биология, вопросы охраны / И.В. Татаренко. – М. : Изд-во "Агрус", 1996. – 207 с.
24. Уранов А.А. Возрастной спектр фитоценопопуляции как функция времени и энергетических волновых процессов / А.А. Уранов // Научные доклады высшей школы. – Сер.: Биологические науки. – 1975. – № 2. – С. 7-34.
25. Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я.П. Дідуха. – К. : Вид-во "Глобалконсалтинг", 2009. – 900 с.

Надійшла до редакції 01.04.2016 р.

Любинец И.П., Хомин И.Г., Ференц Н.М., Лисак Г.А. Состояние ценопопуляции *Platanthera bifolia* (L.) Rich. на территории Украинского Расточья

Изложены результаты исследований экологических особенностей *Platanthera bifolia* на территории Украинского Расточья. В настоящее время ценопопуляции находятся в достаточно безопасном состоянии: они являются молодыми, нормальными, полночленными. У них есть значительная доля особей ювенильного состояния, что свидетельствует о хорошем семенном возобновлении. В ценопопуляциях присутствуют особи трех основных классов виталитета, что уменьшает их уязвимость к неблагоприятным факторам, таковым как мощные деградационные процессы в растительном покрове (вследствие прекращения сельскохозяйственной деятельности), а также антропогенному фактору, а именно весенним поджогами, следы которых наблюдались на одной из пробных площадей.

Ключевые слова: ценопопуляция, любка двулистная, плотность, возрастная и виталитетная структура, Украинское Расточье.

Lyubynets' I.P., Khomyn I.G., Ferents N.M., Lysak G.A. The State of *Platanthera Bifolia* (L.) Rich. Cenopopulation on the Territory of the Ukrainian Roztochya

The paper presents the results of studies of environmental features of *Platanthera bifolia* on the territory of Ukrainian Roztochya. Currently cenopopulations have quite safe conditions: they are young, normal and all age classes are presented. A large proportion of individuals of juvenile status in the age range offers good seeds renovation. In cenopopulations individuals of three major classes of vitality are presented that reduces the vulnerability of populations to adverse factors, which are powerful degradation processes in the vegetation (due to termination of agricultural activity) and anthropogenic factors, such as spring burning, traces of which were observed in one of the sample plots.

Keywords: cenopopulation, *Platanthera bifolia*, density, age and vitality structure, Ukrainian Roztochya.

УДК 582.772.2:581.11(712.41)

ПОРІВНЯЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ВОДОУТРИМНОЇ ЗДАТНОСТІ ЛИСТКІВ РОСЛИН КУЛЬТИВАРІВ *ACER PLATANOIDES* L. В УМОВАХ МІСТА КИЄВА

М.В. Манько¹, Н.О. Олексійченко², О.В. Соваков³

Досліджено водоутримну здатність рослин 10 культиварів *Acer platanoides* L. – *A. p. 'Cleveland'*, *A. p. 'Columnare'*, *A. p. 'Crimson King'*, *A. p. 'Deborah'*, *A. p. 'Drummondii'*, *A. p. 'Emerald Queen'*, *A. p. 'Faassen's Black'*, *A. p. 'Globosum'*, *A. p. 'Princeton Gold'* та *A. p. 'Royal Red'* упродовж літнього сезону. Динаміка втрати води для різних культиварів *A. platanoides* є неоднаковою. Найстійкішими рослинами до посухи в умовах напруженості водного режиму є *A. p. 'Emerald Queen'*, для якого впродовж всього вегетаційного періоду характерні високі показники водоутримної здатності, що варто враховувати під час добору рослин для використання у складних умовах міського середовища.

Ключові слова: клен гостролистий, культивар, водоутримна здатність, листки, посуха, водний режим.

У процесі росту і розвитку рослини періодично піддаються впливу посухи. Це явища в ґрунті та атмосфері, що виникають за тривалої відсутності опадів, високої температури повітря у поєднанні з підвищеним випаровуванням. Все це призводить до порушення водного балансу рослинних організмів [1]. Реакція рослин на нестачу вологи в ґрунті та атмосфері виражається в ступені та характері зміни всіх процесів, що регулюють водний режим рослин. При цьому механізми, що зумовлюють пристосувальну реакцію рослин до чинника зневоднення у різних видів і навіть форм деревних рослин, мають свою специфіку. Важливу роль у цьому процесі відіграють морфологічні ознаки, анатомічна будова органів [2]. Висока посухостійкість зумовлюється здатністю тканин і клітин витримувати та регулювати витрату води, запобігаючи виникненню водного дефіциту, а також здатністю споживати воду з глибоких горизонтів ґрунту [1, 3]. Вивчаючи плодів дерева, Г.П. Єремєєв [4] дійшов висновку, що посухостійкість рослин можна діагностувати за в'яненням їхніх зрізаних гілок і листків. Дослідник встановив зв'язок між посухостійкістю і підвищеною водоутримною здатністю.

Питання посухостійкості рослин деяких видів кленів, зокрема клена гостролистого, вивчали М.А. Кохно [5], К.Б. Плюто [6], І.О. Сенчишина [7], А.Д. Букштинів [8], Н.І. Аксьонова [9]. Більшість видів кленів за своєю потребою у вологості ґрунту – мезофіти [5, 9], тобто потребують помірного зволоження, витримують короточасний водний дефіцит і перегрів та мають порівняно збалансований водний режим і мезоморфну структуру. Незважаючи на зволоження ґрунту, всі види кленів здатні упродовж короткого часу витримувати досить значну посуху [5].

Плюто К.Б. вивчала посухостійкість та показники водного режиму рослин клена гостролистого, а також культиварів *A. p. 'Globosum'* та *A. p. 'Schwed-*

¹ аспір. М.В. Манько – НУ біоресурсів і природокористування України, м. Київ;

² проф. Н.О. Олексійченко, д-р с.-г. наук – НУ біоресурсів і природокористування України, м. Київ;

³ доц. О.В. Соваков, канд. с.-г. наук – НУ біоресурсів і природокористування України, м. Київ