Spruce trees survive and condition and seed productivity of Finnish origin on seed orchard in Vinnytsya region was carried out. The analysis of the dynamics of ripe cones of Finnish origin formation and local population from 2012 till 2016 was made. The relation between tree condition and intensity of seed productivity is investigated. The climate impact on spruce seed productivity was analysed. We also studied the relation of seed productivity with the following climate parameters: average temperature, average minimum and maximum, the amount of temperature during the growing season, the absolute highs and lows, the amount of rainfall per year and growing season, GTK Selyaninova.

Keywords: seed orchard, spruce, condition, seed productivity.

УДК 574.34:639.123

ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ ТА СТАН РЕСУРСІВ ФАЗАНА ЗВИЧАЙНОГО (*PHASIANUS COLCHICUS* L.) В УКРАЇНСЬКОМУ ЛІСОСТЕПУ

В.П. Новицький¹

Досліджено динаміку чисельності та стан ресурсів ценопопуляцій фазана звичайного у сучасному Лісостепу України. Встановлено, що упродовж досліджуваних років максимальна щільність фазана звичайного була на початку 2000-х років у Правобережній провінції (ЛС-2) – 0,70 ос./тис. га. Ліміти щільності фазанів у Правобережній та Лівобережній (ЛС-3) природно-сільськогосподарських провінціях становили відповідно 0,24-0,70 та 0,08-0,59 ос./тис. га, а розмахи між крайніми значеннями, своєю чергою, становили 66,4 та 85,7 % від максимальних. На відміну від ЛС-2, де чітко простежено здатність місцевої ценопопуляції до самовідновлення, кількісний стан ценопопуляції фазанів у ЛС-3 цілком залежав від поповнення угідь штучно вирощеними птахами.

Ключові слова: фазан звичайний, динаміка чисельності, стан ресурсів, Український Лісостеп.

Вступ. Фазан звичайний або кавказький (*Phasianus colchicus* Linnaeus, 1758) – адвентивний мисливський вид, який в Україні ніколи не мав промислового значення, а інтродукувався виключно з цілями спортивного полювання, збагачення фауністичного різноманіття місцевих ландшафтів та у зв'язку з господарсько-корисними особливостями трофіки птахів. Уже протягом 60-х років чисельність виду тут зросла втричі, порівняно до початку 50-х років ХХ ст. – від 15,3 тис. до 45,6 тис. голів. У 70-х роках ця цифра становила 74,5 тис. [1]. За офіційними даними, кількість фазанів на початок ХХІ ст. в Україні становила близько 324 тис. голів з тенденцією до зниження чисельності [2]. Проте, за неофіційними оцінками закордонних науковців [3], тут гніздиться не більше 23-30 тис. пар.

У зв'язку зі зазначеним вище, актуальними виглядають питання оцінювання ресурсів та аналіз динамік чисельності ценопопуляцій фазана звичайного у природно-сільськогосподарських провінціях сучасного Лісостепу України. Варто зауважити, що в розрізі агроекологічного районування подібні дослідження виду у регіоні не проводили.

Мета дослідження – дослідити динаміку чисельності та стан ресурсів фазана звичайного у природно-сільськогосподарських провінціях Українського Лісостепу.

Матеріал та методи дослідження. Для проведення досліджень у розрізі природно-сільськогосподарського районування Лісостепу України відбирали дані статистичної звітності з чотирьох модельних адміністративних областей за таким принципом: Лісостепова Західна природно-сільськогосподарська провінція (ЛС-1) – Тернопільська обл.; Лісостепова Правобережна природно-сільськогосподарська провінція (ЛС-2) – Хмельницька, Вінницька обл.; Лісостепова Лівобережна природно-сільськогосподарська провінція (ЛС-3) – Полтавська обл. Для формування бази даних чисельності виду в окремих природно-сільськогосподарських провінціях Лісостепу України використано показники форм державної статистичної звітності "2-тп (мисливство)" [4], які готувалися протягом 2000-2014 рр. Державною службою статистики України (ДССУ). Математико-статистичне оброблення результатів досліджень проведено за загальноприйнятими методиками [5] на ПК з використанням програмного забезпечення Microsoft Excel 2010 та SPSS Statistics 17.0.

Результати та їх обговорення. За даними Державної служби статистики України, представників цього акліматизованого виду офіційно не зафіксовано у Західному Лісостепу України (Тернопільська обл.), хоча існує достатньо інформації у ЗМІ про регулярні випуски птахів у регіоні, зокрема останніми роками. Донедавна вважалося, що для існування виду в лісостеповій зоні нашої держави частково придатними є тільки найбільш південні її закрайки [6, 7]. Утім, з огляду на зміни клімату з початком ХХІ ст., мисливські користувачі відновили масові спроби з інтродукції птахів в угіддя регіону (рис. 1, 2).

Рис. 1. Динаміка чисельності та розселення фазана звичайного у Лісостеповій Правобережній природно-сільськогосподарській провінції, ХХІ ст.

Аналіз динаміки чисельності птахів у Лісостеповій Правобережній природно-сільськогосподарській провінції упродовж останніх 15-ти років засвідчив її флюктууючий тип (див. рис. 1). Виявлено нестійку 2-4-річну циклічність у змінах чисельності місцевої ценопопуляції фазанів. Загалом, одному-двома рокам підйому чисельності слідували один-три спади різної інтенсивності. Верхні та нижні плато стабілізації чисельності не фіксували, що може опосередковано свідчити про відносну чутливість виду до впливу низки факторів довкілля. Найбільші піки чисельності птахів очевидно провокувалися збільшенням обся-

¹ докторант, с. н. с. В.П. Новицький, канд. с.-г. наук – Інститут агроекології і природокористування НААН

гів довипусків штучно вирощених фазанів (2002, 2013 рр.). Утім, малі піки 2006 та 2009 рр. за стабільної кількості випущених з дичеферм птахів (2005-2012 рр.) можна розглядати як спроможність місцевої популяції до самовідновлення, за сприятливих умов середовища. Амплітуда коливань між максимальним і мінімальним значеннями кількості нарахованих тварин в угіддях провінції становила 1,6 тис. ос. або 64,8 % від максимального. Тоді як амплітуда коливань між максимальним і мінімальним значеннями кількості випущених в угіддя провінції птахів становила 0,3 тис. ос. (lim = 0-300 ос.). Тривалість періоду між максимальною і мінімальною чисельністю становила 5 років.

Вивчення динаміки чисельності птахів у Лісостеповій Лівобережній природно-сільськогосподарській провінції протягом XXI ст. засвідчило її стабільно-флюктууючий тип з тенденцією до зростання щільності ценопопуляції (див. рис. 2). Порівняно з Правобережною провінцією, кількісний стан місцевої ценопопуляції фазанів тут цілком залежав від поповнення угідь штучно вирощеними птахами, що, наразі, не залишає місця для оптимістичних прогнозів до самостійного існування тут виду за даної щільності, мінімальні та максимальні значення якої становили відповідно 36,0 та 84,5 % від лімітів щільностей птахів у ЛС-2. Тому, подальше збільшення щільності фазанів в угіддях завдяки дичерозведенню, на фоні комплексного екологічного моніторингу життєдіяльності виду, посилення біотехнічних заходів, на наше переконання, загалом має сприяти поліпшенню ситуації.

Рис. 2. Динаміка чисельності та розселення фазана звичайного у Лісостеповій Лівобережній природно-сільськогосподарській провінції, XXI ст.

Виявлено нестійку 2-3-річну циклічність у змінах чисельності місцевого угруповання фазанів. Загалом, одному-двом рокам підйому чисельності слідував один рік спаду. Як і у ЛС-2, стійкі нижні та верхні плато стабілізації чисельності не фіксували, найменший показник поточної хвилі відразу супроводжувався, у наступному році, початком росту іншої. Амплітуда коливань між максимальним і мінімальним значеннями кількості нарахованих тварин в угіддях провінції становила 0,9 тис. ос. або 543,4 % від максимального. Тоді як амплітуда коливань між максимальним і мінімальним значеннями кількості випущених в угіддя провінції птахів становила 1,9 тис. ос. (lim = 0-1940 ос.). Тривалість періоду між максимальною і мінімальною чисельністю становила 12 років.

Для більш об'єктивного аналізу кількісного стану місцевих ценопопуляцій фазана звичайного варто розглянути динаміку їх щільності в окремих провінціях, що дасть змогу наочно оцінити та порівняти чисельність виду у перерахунку на одиницю площі різних за розмірами територій (рис. 3). Протягом досліджуваних років максимальна щільність виду спостерігалася на початку 2000-х років у Правобережній провінції – 0,70 ос./тис. га. Амплітуда коливань між максимальним і мінімальним значеннями щільності птахів у мисливських угіддях регіону становила 0,47 ос. Ліміти щільності фазанів у Правобережній та Лівобережній провінціях становили відповідно 0,24-0,70 та 0,08-0,59 ос./тис. га, а розмахи між крайніми значеннями, своєю чергою, становили 66,4 та 85,7 % від максимальних.

Рис. 3. Щільність населення фазана звичайного у природно-сільськогосподарських провінціях Лісостепу України, XXI ст.

У зв'язку з тим, що офіційна оптимальна щільність виду не визначається для лісостепових лісомисливських зон України через кліматичну непридатність територій для існування виду, на думку розробників чинної нормативно-правової бази [8], не маємо можливості провести об'єктивний порівняльний аналіз чисельності птахів. Утім, з огляду на повсюдні, різної успішності, намагання користувачів інтродукувати птахів у місцеві угіддя, спираючись на вдалий закордонний досвід, зокрема північних відносно нашої держави країн Європи, та демонстрацію Правобережної лісостепової ценопопуляції до самостійного наросування (2006, 2008-2010 рр.) чисельності у XXI ст. (див. рис. 1), вважаємо за потрібне розширити чинну шкалу [8] класифікації мисливських угідь згідно з класом бонітету, як мінімум для угруповань фазана Південного і Центрального Лісостепу України.

Висновки. Упродовж досліджуваних років максимальна щільність фазана звичайного спостерігалася на початку 2000-х років у Правобережній провінції (ЛС-2) – 0,70 ос./тис. га. Амплітуда коливань між максимальним і мінімальним значеннями щільності птахів у мисливських угіддях регіону становила 0,47 ос. Ліміти щільності фазанів у Правобережній та Лівобережній провінціях становили відповідно 0,24-0,70 та 0,08-0,59 ос./тис. га, а розмахи між крайніми значеннями, своєю чергою, становили 66,4 та 85,7 % від максимальних. На відміну від ЛС-2, де чітко простежено здатність місцевої ценопопуляції до самовідновлен-

ня, кількісний стан ценопопуляції фазанів у ЛС-3 цілковито залежав від поповнення угідь штучно вирощеними птахами.

Література

1. Насимович А.А. Охотничьи животные – использование, воспроизводство и охрана / А.А. Насимович, А.Н. Шубникова // Природные ресурсы Русской равнины в прошлом, настоящем и будущем : сб. науч. тр. – М. : Изд-во "Либра-Лтар", 1976. – 380 с.
2. Межжерин С.В. Животные ресурсы Украины в свете стратегии Устойчивого развития / С.В. Межжерин. – К. : Изд-во "Логос", 2008. – 282 с.
3. Birds in Europe. Population estimates, trends and conservation status. BirdLife International. Oxford, 2004. – 374 p.
4. Моніторинг чисельності, розселення та добування мисливських видів тварин. [Електронний ресурс]. – Доступний з <http://biomon.org/cadastre/2tp-hunting>. – Назва з екрану.
5. Лакин Г.Ф. Биометрия : учеб. пособ. / Г.Ф. Лакин. – М. : Изд-во "Выш. шк.", 1990. – 352 с.
6. Шарлемань Н. Фазан на Украине / Н. Шарлемань // Охота и охотничье хозяйство : сб. науч. тр. – 1957. – № 2. – С. 27.
7. Курочкин С.Л. Аклиматизация фазана на юге Украины и Молдавии / С.Л. Курочкин // Разведение и создание новых популяций редких и ценных видов животных : сб. науч. тр. – Ашхабад, 1982. – С. 131-136.
8. Настанова з упорядкування мисливських угідь. – К. : Вид-во Держкомлісу України, 2002. – 113 с.

Надійшла до редакції 21.12.2016 р.

Новицкий В.П. Динамика численности и состояние ресурсов фазана обыкновенного (*Phasianus colchicus* L.) в Украинской Лесостепи

Исследована динамика численности и состояние ресурсов ценопопуляций фазана обыкновенного в современной Лесостепи Украины. Установлено, что в течение исследуемых лет максимальная плотность фазана обыкновенного наблюдалась в начале 2000-х годов в Правобережной провинции (ЛС-2) – 0,70 ос./тыс. га. Лимиты плотности фазанов в Правобережной и Левобережной (ЛС-3) природно-сельскохозяйственных провинциях составляли соответственно 0,24-0,70 и 0,08-0,59 ос./тыс. га, а размахи между крайними значениями, в свою очередь, составили 66,4 и 85,7 % от максимальных. В отличие от ЛС-2, где четко наблюдалась способность местной ценопопуляции к самовосстановлению, количественное состояние ценопопуляции фазанов в ЛС-3 полностью зависело от пополнения угодий искусственно выращенными птицами.

Ключевые слова: фазан обыкновенный, динамика численности, состояние ресурсов, Украинская Лесостепь.

Novytskyi V.P. The Population Dynamics and the State of the Resources of the Common Pheasant (*Phasianus Colchicus* L.) in the Ukrainian Forest-Steppe

The population dynamics and resource status of pheasant populations common in the modern forest-steppe of Ukraine are investigated. During the studied years the maximum density of the common pheasant were observed at the beginning of 2000th on the right Bank of the province (BOS-2) – 0,70 ind./ha. Limits to the density of pheasants in the right Bank and left Bank (LS-3) natural and agricultural provinces were respectively 0,24-of 0.70 and 0.08 and 0.59 ind./thousand hectares, and ranges between the extreme values, in turn, amounted to 66.4 and 85.7 % of the maximum. In contrast to the LS-2, where the capacity of local cenopopulations to heal itself is clearly observed, the quantitative state of the cenopopulations of pheasants in the PM-3 is completely dependent on the replenishment of the land farmed birds.

Keywords: common pheasant, population dynamics, the status of the resources, the Ukrainian forest-steppe.

УДК 630*[64+23]

АНАЛІЗ ЛІСОВОГО ФОНДУ ТА ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА НА КОСІВЩИНІ

О.О. Погрібний¹, В.П. Лосюк², В.Я. Заячук³

Проаналізовано лісовий фонд Косівщини за породним складом. Оцінено середню продуктивність деревостанів регіону досліджень. Зібрано статистичні дані господарювання лісгосподарських підприємств Косівського району за п'ятирічний період. Проаналізовано рубки головного користування, рубки догляду та інші види рубок формування та оздоровлення лісів у лісовому фонді регіону досліджень. Визначено обсяги лісозаготівлі та їх вплив на екосистему. Оцінено лісовідновну справу в лісах Косівщини. Встановлено причини погіршення санітарного стану лісів Косівського району.

Ключові слова: лісостан, деревостан, тип лісу, Косівський район, лісовий фонд, санітарні рубки, рубки головного користування, рубки догляду, лісові культури.

Вступ. Ліс – це найбільше надбання та сенс всього життя гуцула. Станіслав Вінценз писав: "Ніщо так не змінило обличчя краю, його краєвиду, ніщо в такій мірі не позбавило його давньої неприступності, не перевернуло господарських занять, звичок, потреб, видатків і всього характеру життя людей, ніщо так не переорало всієї гуцульської самобутності, як оте промислове рубання лісу..." [2]. Виходячи з того, що лісове господарство Гуцульщини здійснюється досить інтенсивно, доцільно дати йому об'єктивну оцінку.

Косівський район розміщений на території Прикарпаття та Покутських Карпат, а тому ліси є невід'ємною частиною його ландшафтів. Площа лісового фонду Косівщини займає 43,5 тис га, що становить 44,1 % від загальної площі району [3]. Він розподілений між трьома користувачами, а саме НПП "Гуцульщина" (7,6 тис. га), ДП "Кутське ЛГ" (16,1 тис. га) та РП "Райагродіс" (19,2 тис. га).

Результати дослідження. Косівщина простягається із передгірської території до середньогір'я Карпат з перепадом висот від 270 до 1472 м н. р. м., а тому лісовий фонд регіону досліджень відзначається високою мінливістю за видовим складом, структурою та типами лісорослинних умов. Найпоширенішими лісами цього регіону є букові ліси (табл. 1), площа яких сягає 19944,5 га, що становить 46,6 % від всієї площі лісової території регіону.

Друге місце за площею займають ліси з переважанням смереки європейської (*Picea abies* Karst.) – 13271 га, тобто 31 % від площі всього лісового фонду. Значно меншу площу займають ялиця біла *Abies alba* Mill. (7,5 %) та дуб звичайний *Quercus robur* L. (5,8 %). Порівняно із попередніми породами, ялицеві та дубові ліси займають значно менші площі у зв'язку з особливістю поширення типів лісорослинних умов на території підприємств та інтенсивністю антропогенного впливу на них упродовж останніх століть. Візуальне уявлення про поширення цих деревних порід на території регіону досліджень дає рис. 1 [1].

Аналізуючи дані рис. 1, можна зробити висновок, що дубові ліси поширені у передкарпатській частині регіону. Вони поступово змінюються буковими лі-

¹ наук. співроб. О.О. Погрібний, канд. с.-г. наук – НПП "Гуцульщина", м. Косів;

² наук. співроб. В.П. Лосюк, канд. с.-г. наук – НПП "Гуцульщина", м. Косів;

³ доц. В.Я. Заячук, канд. с.-г. наук – НЛТУ України, м. Львів